



Hausregeln: Kranke Kinder


**Kranke Kinder dürfen eine Kita nicht besuchen – sie gehören nach Hause.
Dies gilt selbstverständlich auch für unsere Einrichtung.**

Krankheit/Erreger	Symptome	Wiederzulassung von Erkrankten/ Verdächtigen
Magen-Darm-Entzündung (Infektiöse Gastroenteritis) bei Kindern unter 6 Jahren		48 h nach Abklingen der klinischen Symptome (Erbrechen oder Durchfall)
Scharlach		<ul style="list-style-type: none"> • 24 h nach Beginn der Antibiotikatherapie und Abklingen der Symptome • Ohne Therapie: mind. 2 Wochen nach Abklingen der Symptome
Fieber, 3- Tage- Fieber		48 Stunden Fieber/ erhöhte Temperatur frei
Bindehautentzündung	Gerötete und/ oder juckende Augen mit Sekretaustritt	Kein Sekret/ keine Rötung mehr vorhanden. Bei wirksamer Antibiotikatherapie: nach 24 Stunden
Borkenflechte		Ohne Therapie nach Abheilung der betroffenen Hautareale
Mund-Fuß-Hand		Nach Genesung
Influenza (Grippe)		Nach Genesung
Keuchhusten		Erkrankte: <ul style="list-style-type: none"> • 5 Tage nach Beginn einer wirksamen Antibiotikatherapie ODER • 21 Tage nach Beginn des Hustens (bei fehlender Behandlung) Krankheitsverdächtige: <ul style="list-style-type: none"> • o. g. Bedingungen ODER • Negativer Befund mittels Nukleinsäurenachweis (z. B. PCR)
Kopfläuse		<ul style="list-style-type: none"> • Sachgerechte Anwendung eines Mittels zur Tilgung des Kopflausbefalls UND • Sorgfältiges Auskämmen der Haare mit einem Läusekamm
Krätze		Bei immunkompetenten Personen: Direkt nach abgeschlossener Behandlung mit topischem Antiskabiosum bzw. 24 h nach Einnahme von Ivermectin

(Maden-)Würmer	Häufiges Kratzen am Po	Nach erfolgreich, beendeter Therapie
Spul- oder Bandwürmer	allgemeines Unwohlsein, <u>Bauchschmerzen</u> , Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust oder Heißhunger	Nach erfolgreich, beendeter Therapie
Masern		Ärztliche Beurteilung der vorliegenden Infektions- oder Ansteckungsgefahr am 5. Tag nach Auftreten des Exanths
Meningokokken		Klinische Genesung, frühestens 24 Stunden nach Beginn der Antibiotikatherapie
Mumps		Abklingen der klinischen Symptome, immer min. 5 Tage nach dem Beginn der Erkrankung
Röteln		Abklingen der klinischen Symptome, mind. 8 Tage nach Exanthembeginn
Virale hämorrhagische Fieber (VHF)		Abstimmung mit Fachexpertinnen und -experten sowie dem zuständigen Gesundheitsamt
Windpocken		1 Woche nach Beginn einer unkomplizierten Erkrankung
Poliomyelitis		Abstimmung mit Fachexpertinnen und -experten sowie dem zuständigen Gesundheitsamt
Hepatitis A		2 Wochen nach Auftreten der ersten klinischen Symptome bzw. 1 Woche nach Auftreten des Ikterus
Hepatitis E		Klinische Genesung unter Beachtung der allgemeinen Empfehlungen zur Verhütung von Folgeinfektionen
Diphtherie	2-5 Tage, selten bis zu 10 Tagen	Negativer Bakteriennachweis auf 1 Abstrich oder 2 negative Abstrich Ergebnisse
Cholera	Wenige Stunden bis zu 5 Tage	Klinische Genesung und 3 aufeinanderfolgende negative Stuhlbefunde im Abstand von 1-2 Tage

Wiederholte Verstöße gegen die Hausregeln können den Träger dazu veranlassen, nach Abmahnung, das Vertragsverhältnis wegen Pflichtverletzung zu kündigen.


 Verwaltungsleitung
 M.Knöppel


 Leitung
 A.Ludmann